Scheda Descrittori CARCIOFO (CYNARA CARDUNCULUS L. SUBSP. SCOLYMUS) CENTOFOGLIE DI RUTIGLIANO


STATO SCHEDA
Stato: Approvata

CARATTERISTICHE GENERALI
Periodo di semina: semina a febbraio-marzo; tramite ovoli in luglio-agosto; tramite carducci in autunno
Periodo di raccolta: marzo-marzo
Ciclo riproduttivo in normali condizioni di coltivazione: 8-9 mesi
Porzione della pianta utilizzata come prodotto principale: Capolino
Utilizzazione: uso alimentare


CARATTERISTICHE DELLA PIANTA
Diametro fusto principale (misurato 10 cm al di sotto del capolino):: medio
Numero di capolini laterali sul fusto principale: 3
Altezza in cm (con capolino principale): 60
Diametro (cm): 85
Attitudine pollonifera: buona

CARATTERISTICHE DELLE FOGLIE
Attitudine: semi-eretta
Lunghezza (cm): 60
Colore: verde chiaro
Colorazione rossastra alla base della nervatura centrale: assente o molto debole

CARATTERISTICHE DEL CAPOLINO PRINCIPALE
Altezza (cm): 7,5
Diametro (cm): 7,5
Peso con 5 cm di stelo (g): 150-220

Forma della sezione longitudinale: circolare 

Forma dell'apice: arrotondato 

Densità brattee interne: media 

CARATTERISTICHE DELLE BRATTEE ESTERNE
Colore del lato esterno: verde con striature viola

Forma dell'apice: dentellato 

Curvatura delle brattee: verso l'interno 

Spina: assente o molto corta
Forma: tanto lunga quanto larga

AUTORI
Gabriella Sonnante, Salvatore Cifarelli, Francesco Paolo Losavio (IBBR-CNR)

FONTI
http://www.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg184.pdf
http://www.biodiversitapuglia.it/fonti/22-Carciofo.pdf

Inserito il 18/11/2015 12:31:10 da Cifarelli Salvatore (IBBR CNR)
Ultima modifica il 11/10/2016 13:57:45 da Signore Angelo (DISAAT-UNIBA)