Vitigni ad uva nera - Bracciola Nera

Scheda descrittiva semplificata della Vite
(Commissione tecnico-scientifica delle Specie Legnose daFrutto - L.R. 50/97)

periodo della rilevazione: dal 1998 al 2000

luogo della rilevazione (azienda, indirizzo): Azienda Scurtarola – Viadell'uva, 3 – 54100 Massa

NOME VITIGNO ETA' DELLE PIANTE N. PIANTE INDIVIDUATE

Bracciola nera 5 20

SINONIMI

Brasola

UTILIZZAZIONE

o vino

o tavola

o duplice attitudine

CARATTERI OBBLIGATORI

GERMOGLIO ALLA FIORITURA (osservazioni da effettuare su germogli allafioritura)

1) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA ALL'ESTREMITA'

o assente

o al margine

o diffusa

2) DENSITA' DEI PELI ALL'ESTREMITA'

o nulla o leggerissima

o media

o forte

3) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELLE GEMME

o nulla o leggerissima

o media

o forte

4) FORMA DEI CIRRI

o semplici

o bifidi

o trifidi

5) COLORE PAGINA SUPERIORE FOGLIE GIOVANI

o verde

o giallo

o con zone bronzate

o rossastro

6) DENSITA' DEI PELI SU PAGINA INFERIORE FOGLIE GIOVANI

o nulla o leggerissima

o media

o forte

FOGLIA ADULTA (osservazioni da effettuare tra allegagione ed invaiatura)

7) TAGLIA

o piccola

o media

o grande

8) NUMERO DEI LOBI

o foglia intera

o tre

o cinque

o sette o pi?

9) FORMA DEL LEMBO

o cordiforme

o cuneiforme

o pentagonale

o orbicolare

o reniforme

10) SENO PEZIOLARE

o aperto

o a lobi leggermente sovrapposti

o a lobi sovrapposti

11) SENI LATERALI SUPERIORI

o aperti se presenti

o a lobi leggermente sovrapposti

o a lobi sovrapposti

12) FORMA DEI DENTI

o a lati concavi

o a lati rettilinei

o a lati convessi

o un lato concavo ed uno convesso

13) LUNGHEZZA PICCIOLO IN RAPPORTO ALLA NERVATURA MEDIANA

o pi? corto

o uguale

o pi? lungo

14) COLORE PAGINA SUPERIORE

o verde chiaro

o verde

o verde scuro

15) DENSITA' PELI SULLA PAGINA INFERIORE

o leggera

o media

o forte

GRAPPOLO (osservazioni da effettuare dopo l'invaiatura)

16) LIVELLO DI INSERZIONE PRIMO GRAPPOLO

o fino al terzo nodo

o dal quarto nodo in poi

17) NUMERO GRAPPOLI PER TRALCIO

o 1 o meno

o da 1,1 a 2

o da 2,1 a 3

o oltre 3

18) LUNGHEZZA

o corto (fino a 15 cm)

o medio (circa 20 cm)

o lungo (oltre 25 cm)

19) FORMA PREVALENTE

o conica

o cilindrica

20) TIPO PREVALENTE

o semplice

o con ali

o composto

21) COMPATTEZZA

o spargolo

o medio

o compatto

22) DIMENSIONI ACINO

o piccolo

o medio

o grande

23) FORMA ACINO

o appiattito

o sferico

o ellittico

o ovoide

o arcuato

24) PRESENZA DI PRUINA SULL'ACINO

o nulla o leggera

o media

o forte

25) COLORE EPIDERMIDE

o verde

o giallo

o bronzato

o rosa

o rosso

o blu-nero

26) DISTRIBUZIONE COLORE

o uniforme

o non uniforme

27) SPESSORE DELLA BUCCIA

o sottile

o media

o spessa

28) PARTICOLARITA' DEL SAPORE

o nessuno

o moscato

o erbaceo

o foxy (uva fragola)

29) CARATTERISTICHE DELLA POLPA

o croccante

o consistente

o molle

TRALCIO LEGNOSO (osservazioni da effettuare dopo la caduta delle foglie)

30) SEZIONE TRASVERSALE

o circolare

o ellittica

o appiattita

FENOLOGIA (data)

31) GERMOGLIAMENTO

inizio (10 %) 10 aprile

fine (90 %) 17 aprile

32) FIORITURA

inizio (10 %) 7 giugno

piena (50 %) 10 giugno

fine (100 %) 13 giugno

33) INVAIATURA

inizio (10 %) 1 agosto

fine (100 %) 12 agosto

34) VENDEMMIA

3 decade di settembre

35) GIUDIZIO QUALITATIVO GENERALE

o negativo

o mediocre

o buono

o ottimo

36) GIUDIZIO AGRONOMICO COMPLESSIVO

Media vigoria e buona produzione

CARATTERI FACOLTATIVI

GERMOGLIO ALLA FIORITURA

37) PORTAMENTO

o eretto

o semieretto

o orizzontale

o semiricadente o ricadente

38) COLORE INTERNODI

o verde

o verde striato di rosso

o rosso

39) COLORE DEI NODI

o verde

o verde striato di rosso

o rosso

FOGLIA ADULTA

40) BOLLOSITA' DEL LEMBO

o leggera

o media

o forte

GRAPPOLO

41) LUNGHEZZA VINACCIOLI

o corti

o medi

o lunghi

42) PESO MEDIO GRAPPOLO

350 g

43) COLORAZIONE DELLA POLPA

o incolore

o colorata

TRALCIO LEGNOSO

44) COLORE

o grigiastro

o giallastro

o bruno-giallastro

o bruno-rossastro

PATOLOGIE

45) SENSIBILITA' A PERONOSPORA

o scarsa

o media

o elevata

46) SENSIBILITA' A OIDIO

o scarsa

o media

o elevata

47) SENSIBILITA' A BOTRITE

o scarsa

o media

o elevata